



U.O.C. di Radiodiagnostica & U.O.C. di Neuroradiologia

TAC con contrasto – NOTE per il paziente

Il paziente deve essere a DIGIUNO da almeno 6 ore, quindi:

- per esame da eseguire di mattina NON deve fare colazione;
- per esame da eseguire di pomeriggio può fare colazione, ma NON deve pranzare;
- eventuale terapia farmacologica va assunta regolarmente con acqua.

Eseguire e portare in visione l'esame ematochimico della CREATININA.

Portare DOCUMENTAZIONE clinica precedente riguardo l'esame da eseguire (ecografie, TAC, RM, visite specialistiche, lettera di dimissione, ecc...).

I pazienti che abbiano qualunque problema di ALLERGIA devono eseguire la preparazione antiallergica.

PREPARAZIONE ANTIALLERGICA

Deltacortene da 25 mg da assumere nel seguente modo:

- 2 compresse 13 ore prima dell'esame;
- 2 compresse 7 ore prima dell'esame;
- 2 compresse 1 ora prima dell'esame.

Inoltre 1 ora prima dell'esame assumere anche 1 compressa di un qualunque antistaminico.

IL DIRETTORE
UOC NEURORADIOLOGIA
Dr.ssa Maria Annunziata Gentile

IL DIRETTORE
UOC RADIODIAGNOSTICA
Dr. Roberto Calbi